

تعرف على الحقائق

جدري القروء

ما جدري القروء؟

جدري القروء مرض يسبب طفحًا جلديًا مُعدّيًا. يبدأ الطفح الجلدي صغيرًا، ويتغير شكله غالبًا على مدار فترة المرض.

ما الأعراض؟

تشمل الأعراض غالبًا طفحًا جلديًا مميزًا أو قروءًا تبدأ في شكل بقع أو حطاطات (نتوءات صغيرة تشبه الدمامل)، تتحول بدورها إلى حويصلات (آفات مليئة بالسائل مثل البثور)، والبهثرات (آفات مليئة بالصديد). يُصاب البعض فقط كذلك بالحمى أو القشعريرة، والتعب، وألم العضلات أو الجسم، وتضخم العقد اللمفاوية، وألم البلع وصعوبته. ويكون في مرحلة الحويصلات والبهثرات في الطفح الجلدي نقرة صغيرة في المركز.

كم تكون مدة هذا المرض؟

تبلغ المدة بين التعرض والإصابة بالعدوى في المتوسط حوالي أسبوع إلى أسبوعين، ولكن يمكن أن تصل المدة إلى 21 يومًا. بناءً على المعلومات التي نعرفها الآن، يمكن للفرد نشر جدري القروء منذ وقت بدء الأعراض حتى تكون قشرة على الطفح الجلدي وتكون جلد جديد (يستغرق ذلك عادةً حوالي 3 أسابيع).

كيف ينتشر جدري القروء؟

- الملامسة المباشرة: وهي المصدر الرئيسي للانتشار. يمكن أن ينتشر جدري القروء من شخص إلى آخر باللمسة المباشرة للطفح الجلدي أو القروح. يحدث ذلك عادةً عن طريق العلاقة الجنسية أو الاتصال اللصيق الحميم.
- الانتشار عن طريق الأدوات المُعدية: الاتصال غير المباشر نادر، لكن مشاركة المناشف أو البطاطين، أو الأقمشة الأخرى، يزيد الخطر إذا لامس القماش قبلها القروح لدى شخص مصاب بالعدوى ثم تعامل معه شخص آخر غير مصاب بالعدوى.
- توجد مخاطرة منخفضة بالإصابة بجدري القروء من مجرد الوجود في غرفة واحدة مع حالة مصابة به.

من المعرضون لخطر جدري القروء؟

يمكن أن يُصاب أي شخص بجدري القروء، لكن المخاطرة تصل أقصاها لمن يخالطون شخصًا ذا نتيجة إيجابية مخالطة حميمة ومباشرة، أو من كان لديهم شركاء حميمون مجهولو الهوية مؤخرًا. كانت أغلب الحالات المكتشفة حتى الآن من الرجال المثليين أو مزدوجي الميول الجنسية، ممن يمارسون الجنس مع الرجال.

المخاطرة في الأطفال في سن المدرسة منخفضة.

ما الإجراءات الوقائية والعلاجات المتاحة؟

- يتوفر لقاح للمخالطين اللصيقين الذين تعرضوا لحالة ما. ويمكن أن يتلقاه الأطفال والمراهقون في مكتب مقدم الرعاية الصحية، وبالتعاون مع Chicago Department of Public Health.
- العلاج متاح، وينبغي مناقشته بالتعاون مع مقدم الرعاية الصحية.



تعرف على الحقائق جدري القروء

ما الذي ينبغي أن تفعله المدارس؟

- السماح للعاملين والطلبة بمرونة ملازمة المنزل عندما يمرضون.
- إذا أبلغ أحد الطلبة أو العاملين عن حالة مؤكدة من جدري القروء، يُرجى إبلاغ فريق CDPH Youth Settings لإجراء تقييم خطر للمخالطين وإحالة المؤهلين للتطعيم.
- من تعرضوا لحالة إيجابية لا داعي لاستبعادهم من المدرسة.

ما توصيات الاستبعاد؟

- من تأكد تشخيص إصابتهم بجدري القروء ينبغي استبعادهم من المدرسة حتى تقشر الطفح الجلدي وتكون طبقة جديدة من الجلد، وهو ما يستغرق مدة تصل إلى 3 أسابيع.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.chicago.gov/city/en/depts/cdph/supp_info/health-protection/get-the-facts-monkeypox.html

