CONOZCA LOS HECHOS Su bebé se lo agradecerá

Usted puede contraer sífilis u otras enfermedades de transmisión sexual más de una vez. Si desea más información, hable con su doctor o proveedor de cuidado de la salud, o llame o visite una de las clínicas de enfermedades sexuales del Departamento de Salud Pública.



AUSTIN STI SPECIALTY CLINIC 4958 W. MADISON

Telefono: (312) 746-4871, (312) 746-4872 M, W 8am-4pm T, Th 9am-5pm



LAKEVIEW STI SPECIALTY CLINIC 2861 N. CLARK, 2ND FLOOR

Telefono: (312) 744-5507, (312) 744-1628 M, W, F 8am-4pm T, Th 10am-6pm



ROSELAND STI SPECIALTY CLINIC 200 E. 115TH ST.

Telefono: (312) 747-2831, (312) 747-0054M 8am-4pm
Th 9am-5pm







FACEBOOK: /CHICAGOPUBLICHEALTH TWITTER: @CHIPUBLICHEALTH



PROTEJA A SU BEBÉ

de **La Sí**



¿QUÉ ES LA SÍFILIS CONGÉNITA?

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS). La sífilis congénita ocurre cuando una mujer embarazada con sífilis transmite la infección al feto y puede causar problemas graves como prematuridad y bajo peso al nacer, deformidades y mortinatos (bebés muertos al nacer).

PRUEBAS PRENATALES: PUEDEN SALVAR UNA VIDA

Si usted está embarazada o planea quedar embarazada, es importante recibir atención prenatal de rutina y recibir una prueba para la sífilis.

Las mujeres embarazadas deben recibir pruebas de sífilis en la primera visita prenatal, durante el tercer trimestre (28 semanas) y en el parto. Después de la prueba de sífilis, asegúrese de obtener los resultados y seguir consejo médico.

TRATAMIENTO: UN PLAN DE ACCIÓN

La sífilis puede ser tratada, incluso cuando usted está embarazada.

El tratamiento adecuado de la sífilis durante el embarazo evitara que su bebé se infecte .

El Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) ofrece pruebas de sífilis GRATIS y tratamiento.

¡Toma Nota!

Si usted tiene La Sífilis, informa a su pareja sexual, porque van a necesitar un examen y tratamiento. Esto le ayudará a mantenerse saludable, evitar infectar a otras personas y evitar volver a infectar a usted.

DATOS IMPORTANTES PARA RECORDAR

- Todas las etapas de la sífilis son curables .
- Si la sífilis no es tratada en sus primeras etapas, puede propagarse a través del cuerpo y causar daños permanente en el corazón y el sistema nervioso.
- La sífilis se puede pasar al bebé en cualquier momento durante el embarazo.
- Si una mujer contrae sífilis durante el embarazo, el bebé puede nacer muerto o puede morir poco después del nacimiento
- Un bebé infectado puede nacer sin signos o síntomas de la enfermedad . Sin embargo , si no se trata de inmediato , el bebé puede desarrollar graves problemas físicos y de aprendizaje.

LAS PRUEBAS DE RUTINA: SON BUENAS!

No todas las personas con sífilis tienen síntomas, y si los tienen puede no notarlos.

Algunas personas pueden desarrollar una úlcera o erupción en algún lugar de sus cuerpos, pero la única manera de estar seguro es con un sencillo análisis de sangre.

Usted debe solicitar la prueba. La pruebas de la sífilis no es parte de un examen físico de rutina o de una pruebas de Papanicolaou .

Si usted cree que puede estar en riesgo de contraer la sífilis u otras enfermedades de transmisión sexual, informe a su médico. No espere que le pregunten.

Las pruebas están disponibles a través de su proveedor de atención médica o en una clínica del Departamento de Salud Publica de Chicago.