



CDPH

Chicago Department
of Public Health



Protégete contra el sarampión

Dos semanas antes de viajar, asegúrate de estar al día con tus vacunas contra el sarampión.

Los menores de entre **6-11 meses de edad** que van a viajar internacionalmente, **deben de recibir una dosis de vacuna de MMR.**

Los niños mayores a los 12 meses de edad deben recibir **2 dosis de la vacuna MMR**, con un intervalo de tiempo de 28 días entre ellas.

- 📍 Si planeas viajar al extranjero, consulta con tu proveedor de salud al menos 2 meses antes de tu viaje para asegurarte de que tanto tú como tu hijo estén al día con las vacunas.
- 📍 Los casos de sarampión en EE. UU. ocurren con mayor frecuencia cuando una persona que no está vacunada, viaja al exterior, se infecta y regresa al país.
- 📍 Cuando regreses a tu lugar de origen, si alguien presenta fiebre y sarpullido dentro de las 3 semanas siguientes, contacta a tu proveedor de salud e infórmale sobre tu viaje reciente.
- 📍 También se están registrando brotes de sarampión en EE. UU.; consulta con tu proveedor para saber si necesitas recibir dosis adicionales de la vacuna contra el sarampión antes de viajar.
- 📍 Para más información, visita [Chicago.gov/measles](https://www.chicago.gov/measles).